

# Dente per dente

Piccolo vademecum per bambini allo sbaraglio



Solitamente a partire dallo svezzamento, la natura viene incontro ai nostri piccoli stimolando l'eruzione dei denti da latte.

A intervalli di circa 6 mesi l'uno dall'altro, i denti da latte, a gruppi, cominciano a farsi breccia tra le gengive dei nostri piccoli, creando non pochi problemi.

Ecco i 3 passi per uscirne incolumi!

1

## PREVENZIONE

Tutto ciò che si può fare per prevenire i principali fastidi

2

## LA FASE ACUTA

Omeopatia e farmacologia tradizionale a braccetto

3

## L'URGENZA

Quando si supera il limite (rari casi per fortuna)

Lo sapevi?



### Acci-denti!!

Durante l'eruzione dei denti da latte spesso le feci dei piccoli sono liquide, scure e acide, ricche di muco con conseguente irritazione della pelle del sederino.



### Ma che dolce museruola

Intorno alla bocca possono formarsi tanti piccoli punti rossi, segni di una dermatite dovuta all'abbondante salivazione che si alla nascita dei dentini

**1**

Da quando il piccolo inizia ad avere la tendenza a mettere tutto in bocca e a sbavare un pochino di più (**circa verso i 4 mesi**) si può stimolare l'ispessimento gengivale con degli spazzolini specifici in gomma (liscia o zigrinata) muniti di blocco per impedire l'ingestione. Possono essere anche messi in frigorifero per rinfrescare la bocca - **Set Dentaruoli di Allenamento NUK con Anello di Sicurezza**

**Ai primi arrossamenti della gengiva procedere con una terapia omeopatica**

**Chamodent globuli Locker:** 5-7 globuli 3 volte al giorno lontano dai pasti, sciogliere in un cucchiaino di acqua o direttamente in bocca come caramelline

**Chamodent Baby Gel Locker :** applicare una piccola quantità di prodotto sul dito e massaggiare delicatamente la gengiva, 4 -5 volte al giorno lontano dai pasti. Conservare in frigorifero

**2**

**All'aumento dei sintomi associare la terapia omeopatica a quella farmacologica classica:**

**Chamodent globuli Locker:** 5-7 globuli ogni 15 minuti fino all'attenuarsi dei sintomi

**Chamodent Baby Gel Locker o Balsamo primi denti gel gengivale :** applicare una piccola quantità di prodotto sul dito e massaggiare delicatamente la gengiva

**Viburcol supposte omeopatiche:** 1 supposta più volte die in fase acuta, dopo miglioramento 1 supposta 2-3 volte die nei neonati sino a sei mesi 1\2 supposta con identica posologia. Viburcol, può essere assunto anche in associazione ad altri prodotti e farmaci per aumentarne l'effetto e la durata

**Paracetamolo:** in supposte o sciroppo in dosi regolate in base all'età

**3**

**In caso di dolore importante e febbre alta:**

Contattare il pediatra di famiglia per eventuale terapia della fase acuta con ibuprofene pediatrico - Nurofen e/o paracetamolo

**Dentinale in crema:** applicazione locale direttamente sulle gengive arrossate; applicare il prodotto con un batuffolo di cotone o direttamente sulla mucosa e massaggiare delicatamente.